


Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet

Jämförelser mellan landsting
2011



PROSTATACANCER

- 31 Väntetid till första besöket hos specialist
- 32 Skelettscintigrafi vid prostatacancer av lågrisktyp
- 33 Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp
- 34 Kurativ behandling vid prostatacancer av lokaliserad mellan- och högrisktyp
- 35 Behandling vid lokalt avancerad prostatacancer




Diagram 31
Män

Väntetid från remissdatum till första besök hos specialist vid utredning för prostatacancer, 2009.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 32
Män

Andel män med lokaliserad prostatacancer som genomgår skelettscintigrafi, 2009. Avser män med lågrisktmör.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 32
Riket

Andel män med lokaliserad prostatacancer som genomgår skelettscintigrafi. Avser män med lågrisktumör. Trend 2000–2009

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 33
Män

Andel män med prostatacancer som får aktiv monitorering, 2009. Avser män 75 år eller yngre med lågrisktumör.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 34
Män

Andel män med prostatacancer som får kurativt syftande behandling, 2009.
Avser män 75 år eller yngre med mellan- och högrisktumörer.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 34
Riket

Andel män med prostatacancer som får kurativt syftande behandling. Avser män 75 år eller yngre med mellan- och högrisktumörer. Trend 2000–2009.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 35
Män

Andel män med prostatacancer som får neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling eller bicalutamid som monoterapi, 2008–2009. Avser män 75 år eller yngre med högrisktumör.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret




Diagram 35
Riket

Andel män med prostatacancer som får neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling eller bicalutamid som monoterapi.

Avser män 75 år eller yngre med högrisktumör. Trend 2000–2009.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret